

รายการยาและวันหมดอายุหลังเปิดใช้

(Update 2/2016)

Product	Refrigerated 2-8°C	Room temp 15-30° C	Room temp. 15-30°C	Note
		กรณีแบ่งบรรจุ	บรรจุภัณฑ์จากบริษัท	
Medication in procedure				
Acetic acid 1%,3%		6 months	1 year	หรือไม่เกินวันหมดอายุระบุจากบริษัท
Acetone			1 year	หรือไม่เกินวันหมดอายุระบุจากบริษัท
Alcohol 70% Solution			7 days กรณีที่ใช้ใน รพ. 1 month กรณีให้ผู้ป่วยกลับบ้าน	กรณีใช้ในรพ. มีการเปิดขวดบรรจุใช้บ่อยทำให้ Alcohol ระเหยออก ความเข้มข้นของ Alcohol จะลดลง ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
Alcohol 95%			7 days	
Alcohol Handrub in Pump Bottle (Handi-C)			1 month	
Alcohol Automatic Handrub			ตามที่ระบุจากบริษัท	
Ammonia Solution		6 months	1 year	
BCG Vaccine	2 hours			Live vaccine
Benzoin Tincture		6 months		
Cavilon Cream			2 months	
Cavicide Spray/ Caviwipes			3 months	
Chlorhexidine 2% in 70% Alcohol			7 days	
Chlorhexidine scrub 4% (Hibiscrub)		7 days กรณีใช้ในโรงพยาบาล 1 month กรณีให้ผู้ป่วยกลับบ้าน	1 month	
Chlorhexidine hand-pump 4%			1 month	
Cidex OPA			14 days	
Cocaine Solution			1 month	
Dakins Solution			7 days	
Elmetacin Spray 50 MI*			6 months	
Ethyl Chloride Spray			6 months	
Emla Cream			3 months	
Gentian Violet			6 months	
Glytrin Spray			3 months	
Hale's blue boy		1 month	1 year	แบ่งบรรจุครั้งละไม่เกิน 120 ml เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
Hexabrix			1 month	
Hibitane dilution(1:10/ 1:100 / 1:200)		7 days		
Hibitane Concentrate			1 month	
Hydrogen Peroxide		6 months	6 months	

รายการยาและวันหมดอายุหลังเปิดใช้

(Update 2/2016)

Product	Refrigerated 2-8°C	Room temp 15-30° C	Room temp. 15-30°C	Note
		กรณีแบ่งบรรจุ	บรรจุภัณฑ์จากบริษัท	
K-Y Jelly / Lubricating gel			3 months	
Lidocaine 1%, 2%			3 days	
Lidocaine 1%, 2% with Adrenaline			3 days	
Lidocaine Spray			6 months	
Lugol 's Solution			1 month	
Methylene Blue Injection			24 hours	
Monsel Solution		6 months	3 year	
N.S.S. Irrigation			24 hours กรณีที่ใช้ใน รพ. 1 month กรณีให้ผู้ป่วยกลับบ้าน	
Olive Oil			6 months	
OPV Multiple dose	24 hours			
Povidone Iodine (Betadine) Scrub Solution			7 days	ในขวดแบ่งบรรจุ เมื่อเปิดใช้แล้วมีอายุ 7 วัน, ในขวดบรรจุของผลิตภัณฑ์เมื่อเปิดแล้วมีอายุ 90 วัน
Povidone Iodine (Betadine) Solution			1 month	ห้ามใช้หากยามีลักษณะขุ่นเหนียว
Prostigmine Injection	2 weeks			
Savion 1:100 for Douche/Dressing			7 days หลังผสมแล้ว	
Sevorane			3 months	
Silver Nitrate powder		6 months (หลังจากเตรียมเป็น solution)	1 year	-หรือไม่เกินวันหมดอายุระบุจากบริษัท -เก็บป้องกันแสง
Simple Syrup 85%		1 month	1 year	แบ่งบรรจุครั้งละไม่เกิน 120 ml เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
Sterile water irrigate			24 hours	
Succinyl Injection	2 weeks			
Suprane			3 months	
Telebrix-350			24 hours	
Thiopental Injection	24 hours			
Triamcinolone Injection			1 month	
Trichloroacetic acid (TCA) 10%, 50%		6 months		
Tuberculin Test	24 hours			
Ultrasound Gel			3 months	
Verkon			7 days	

รายการยาและวันหมดอายุหลังเปิดใช้

(Update 2/2016)

Product	Refrigerated 2-8°C	Room temp 15-30° C	Room temp. 15-30°C	Note
		กรณีแบ่งบรรจุ	บรรจุภัณฑ์จากบริษัท	
General medication				
ยาตาทุกชนิด	1 month		1 month	ยาหยอดตาที่เป็นยาน้ำแขวนตะกอนไม่ควรเก็บในตู้เย็น
ยาตา (ใช้ทำหัตถการภายนอก)			3 months	
ยาหยอดหูทุกชนิด			1 month	
ยาน้ำรับประทานทั่วไป			3 months	ห้ามใช้หากมีลักษณะสี ความหนืดเปลี่ยนไป หรือมีตะกอน หรือจับเป็นก้อนแข็ง
ยาใช้ภายนอก : ครีม ชีผึ้ง			3 months	ห้ามใช้หากมีลักษณะเปลี่ยนไปเช่น สีเปลี่ยน เย็นเหลว มีน้ำมัน แยกชั้น เนื้อครีมหดรตัว เป็นเม็ดเล็ก ๆ
ยาใช้ภายนอก : Spray			6 months	
Medication				
Injection medication				
Clinomel/Oliclinomel/Kabiven Infusion	7 days (หลังจากผสม)		24 hrs. (หลังจากต่อ IV set)	
Heparin Leo 25,000 unit/5 ml	14 days		14 days	
Ketamine 50mg/ml (10ml/vial)	8 days			
Insulin				
Humulin N Vial/Cartridge Humulin 70/30 Vial/Cartridge Humalog mix 25 Cartridge Novomix 30 Cartridge Insulatard Cartridge Mixtard Cartridge	1 month		1 month	ก่อนใช้ให้คลึงขวดให้ยากระจายตัว ห้ามเขย่าและห้ามใช้หากพบว่ามียาบางส่วนติดที่ก้น/ข้างขวด
Humalin R vial Humalog Cartridge Actrapid Cartridge Novorapid Cartridge Lantus solostar	1 month		1 month	ห้ามใช้หากพบยาขุ่น มีสีจาง ๆ หรือมีผลึกแขวนลอย
Actrapid Vial	3 months		1 month	ห้ามใช้หากพบยาขุ่น มีสีจาง ๆ หรือมีผลึกแขวนลอย
Mixtard Vial	3 months		1 month	ก่อนใช้ให้คลึงขวดให้ยากระจายตัว ห้ามเขย่าและห้ามใช้หากพบว่ามียาบางส่วนติดที่ก้น/ข้างขวด