

ลำดับที่	ชื่อยา	คำเตือน
1	Fosamax Plus(70 Mg) Tablet	รับประทานยาพร้อมน้ำเปล่าแก้วใหญ่ (180-240ซีซี)ก่อนอาหาร 30 นาทีในตอนเช้า ห้ามทานยาพร้อมอาหาร กาแฟ แคลเซียมและน้ำส้ม เพราะจะทำให้การดูดซึมยาลดลง และไม่ควรรอนลงภายในเวลา 30 นาที หลังรับประทานยา จึงห้ามรับประทานยาก่อนนอน
2	Bonviva Fct 150 Mg Tablet	รับประทานยาพร้อมน้ำเปล่าแก้วใหญ่ (180-240ซีซี)ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงในตอนเช้า ห้ามทานยาพร้อมอาหาร กาแฟ แคลเซียมและน้ำส้ม เพราะจะทำให้การดูดซึมยาลดลง และไม่ควรรอนลงภายในเวลา 30 นาที หลังรับประทานยา จึงห้ามรับประทานยาก่อนนอน
3	Alum Milk (1000 MI) **	รับประทานยา 1-3 ชั่วโมงหลังอาหาร รับประทานห่างจากธาตุเหล็ก 2 ชั่วโมง และห่างจากผลไม้รสเปรี้ยว 3 ชั่วโมง เนื่องจากน้ำผลไม้ เพิ่มการดูดซึมของ Aluminium อาจทำให้เกิดพิษจาก Aluminium ได้
4	Alum Milk (240 MI) **	รับประทานยา 1-3 ชั่วโมงหลังอาหาร รับประทานห่างจากธาตุเหล็ก 2 ชั่วโมง และห่างจากผลไม้รสเปรี้ยว 3 ชั่วโมง เนื่องจากน้ำผลไม้ เพิ่มการดูดซึมของ Aluminium อาจทำให้เกิดพิษจาก Aluminium ได้
5	Cifloxin (250 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้ การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
6	Cifloxin (500 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้ การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
7	Ciprobay (250 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้ การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
8	Ciprobay (500 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้ การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
9	Avelox (400 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้ การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
10	Cravit (250 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้ การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
11	Cravit (500 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้

		การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
12	Lefloxin 500 Mg Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้
		การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
13	Darflox (100 mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้
		การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
14	Tarivid (100 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้
		การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
15	Ofloxin (200 Mg) Tablet	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้
		การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
16	Tetraphos-250 Mg(Mp) Capsule	ไม่ควรรับประทานยาร่วมกับเหล็ก ยาลดกรด นม หรือผลิตภัณฑ์นม ที่มีส่วนผสมของ Calcium, Magnesium หรือ Aluminium เพราะจะทำให้
		การดูดซึมยาลดลง โดยควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
17	Nizoral (200 Mg) Tablet	ควรรับประทานพร้อมอาหารเพื่อเพิ่มการดูดซึมยา รับประทาน Calcium, Magnesium
18	Ketoconazole (200 mg) Tablet	ควรรับประทานพร้อมอาหารเพื่อเพิ่มการดูดซึมยา รับประทาน Calcium, Magnesium